

باكتوسيل

+ شراب



+ تركيبة خاصة تحتوى على بيبودوكوس أسيدى لاكتيسى

(هى عباره عن بكتريا منتجہ لحمض اللاكتيك)

(مسجلة فى الأتحاد الأوروبى ب MA18/5M)

+ له خاصية الإذابة والثبات الأمثل فى ماء الشرب

+ يعمل على إعادة التوازن البكتيرى للأمعاء

١٠٦ شارع الملك فيصل - جيزة - مصر

تليفون : ٣٣٨٤٧١٧٢ - ٣٣٨٤٠٩٢٠ / ٠٢ / فاكس : ٣٣٨٦١٤٨٦ / ٠٢ /
marketing@gmail.com www.egavetgroup.com

LALLEMAND



باكتوسيل شراب

- تركيبه خاصة تحتوى على بیدوكوكس أسيدى لاكتيسي (هى عبارة عن بكتريا منتجة لحمض اللاكتيك) (مسجله فى الاتحاد الاوروبى بـ MA18/5M)
- له خاصية الازابه والثبات الأمثل فى ماء الشرب .
- إعادته التوازن البكتيرى للأمعاء .

مميزات اضافته على ماء الشرب

- + فإن الطيور حتى فى حالات الاجهاد تستمر بالشرب حتى تعوض أثر ارتفاع درجة الحرارة والجفاف
- + يضمن ماء الشرب تفاعل سريع للمنتج وبالتالي أفضل أداء وتأثير لبكتريا البروبايوتيك
- + ماء الشرب يسمح بمرونه كبيرة لاستخدام المنتج من حيث (ضبط الجرعه، الاضافات المختاره الأخرى)

المنتج

إن باكتوسيل شراب عبارة عن تركيبه خاصة من البروبايوتيك يتم اضافته لماء الشرب وهو يحتوى على بكتريا منتجة لحمض اللاكتيك (بیدوكوكس أسيدى لاكتيسي MA18/5M) تم تسجيلها والسماح بها من قبل الاتحاد الأوروبي لدجاج التسمين والبيض .

الخصائص المميزه لل (باكتوسيل شراب)

- الإنتاج المميز والكفاء لحمض اللاكتيك من المواد الكربوهيدراتيه (وبالتالى طاقه أكثر)
- تحفيز البكتيريا النافعة المنتجة لحمض اللاكتيك الموجوده على طول الأمعاء (وبالتالى يحسن الهضم)
- ينتشر ويذوب ويستقر بصورة ممتازة فى ماء الشرب حيث أنه يقاوم عوامل كثيره مثل (الأس الهيدروجينى الحمضى الكلور ، الخ) (وبالتالي نضمن نشاط ثابت على طول الجهاز الهضمى)
- * إن إمداد الدواجن بال (باكتوسيل شراب) يحسن التوازن المعوى التى ينعكس على صحة الطيور وأدائها الإنتاجى



الأهداف

إرشادات الاستخدام	أنواع الدواجن		الفترة
	فترة العلاج	البياض / الأمهات	
• يفضل استخدام مضخة الجرعة	٧ - ١٠ ايام	✓	التفريخ
• فى حالة عدم استخدام مضخة الجرعة يرجى إتباع الأتى:	٧ - ١٥ يوم	✓	بعد الفقس / النقل إلى العنبر
• تعطى جرعة الباكوتوسيل شراب فى ماء الشرب بحيث لا تزيد المدة عن ٦ ساعات	١٠ - ١٥ يوم	✓	بعد العلاج بالمضادات الحيوية
• لا يتم استخدام اية مضادات حيوية أو علاجات أخرى أثناء استخدام الباكوتوسيل شراب	٥ ايام قبل / ٥ ايام بعد	✓	فترات التحصينات
• يجب تنظيف خزان المياه جيداً قبل وبعد استخدام الباكوتوسيل	١٠ - ١٥ يوم	✓	مشاكل هضمية
• تحضر جرعة الباكوتوسيل فى ماء الشرب يومياً	١٠ - ١٥ يوم	✓	النفوق المفاجئ (يرتبط دائماً بوجود بكتريا الإي كولاى)
	١٥ يوم	✓	٤-٥ أسابيع بعد وضع البيض (زيادة أخذ العلف)
	١٥ يوم	✓	نهاية فتره وضع البيض (مشاكل قشرة البيض و جودتها)

الجرعة (معدلات الأضافة وطرق التعبئة)

- عبوات ٢٠٠ جم تستخدم بمعدل (٢٠٠ جم / ١٠٠٠ لتر) فى الظروف الطبيعية
- (٤٠٠ جم / ١٠٠٠ لتر) فى فترات التحدى للطائر